

MISURE DI CONTENIMENTO PER IL RISCHIO DIFFUSIVO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2

| LIVELLO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO | CRITERI CONTESTUALI DEL RISCHIO DIFFUSIVO | MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER IL PAZIENTE | MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER I SOCCORRITORI | MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO PER IL MEZZO DI SOCCORSO |
|---|--|---|---|--|
| Misure STANDARD | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualsiasi codice di attivazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telino monouso di copertura | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Igiene delle mani prima e dopo il trasporto ▪ Impiego dei DPI di base | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulizia accurata delle superfici ambientali e delle attrezzature con acqua e detergenti classici ▪ Adeguato smaltimento dei rifiuti sanitari speciali |
| Misure DI ATTENZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualsiasi codice di attivazione ▪ Presenza di sintomi similinfluenzali (febbre, tosse, raffreddore e mal di gola) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telino monouso di copertura ▪ mascherina chirurgica ▪ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica ▪ Guanti in vinile o nitrile monouso | <ul style="list-style-type: none"> ▪ mascherina chirurgica ▪ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica prima e dopo il trasporto ▪ Impiego dei DPI di base (compresi i guanti in vinile o nitrile monouso e gli occhiali/visiera di protezione) ▪ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, ridurre al minimo il numero di soccorritori che entrano in contatto con la vittima e l'ambiente entro cui essa si trova ▪ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, mantenere una distanza di almeno 2 metri dal paziente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accensione della ventola di areazione durante il trasporto ▪ Pulizia accurata delle superfici ambientali e delle attrezzature con acqua e detergenti classici ▪ Areazione prolungata del vano sanitario ▪ Adeguato smaltimento dei rifiuti sanitari speciali |
| Misure DI SOSPETTO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice di attivazione: C15-INFETTIVO ▪ Presenza di sintomi similinfluenzali (febbre, tosse, raffreddore e mal di gola) ▪ Riferito rientro della vittima da zone a rischio o da comuni italiani della "zona rossa" da meno di 14 giorni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telino monouso di copertura ▪ mascherina chirurgica ▪ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica ▪ Guanti in vinile o nitrile monouso | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavaggio e disinfezione delle mani con soluzione alcolica prima e dopo il trasporto ▪ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, ridurre al minimo il numero di soccorritori che entrano in contatto con la vittima e l'ambiente entro cui essa si trova ▪ Se non diversamente reso necessario dall'esecuzione di manovre salva-vita, mantenere una distanza di almeno 2 metri dal paziente ▪ Corretta vestizione e svestizione dei DPI specificatamente forniti per la gestione dell'emergenza "COVID-19": <ol style="list-style-type: none"> 1) Tuta impermeabile 2) Occhiali/visiera di protezione 3) Maschera con filtrante FFP2 o FFP3 4) Guanti in vinile o nitrile monouso | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accensione della ventola di areazione durante il trasporto ▪ Pulizia accurata delle superfici ambientali e delle attrezzature con acqua e detergenti classici, seguita dalla disinfezione delle stesse tramite panni monouso con prodotti a base di ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5% o perossido d'idrogeno allo 0.5% ▪ Areazione prolungata del vano sanitario ▪ Adeguato smaltimento dei rifiuti sanitari speciali |